


2017年3月
沼津中央高校 保健室発行



耳 こんなときは病院へ

- かゆい** (Itchy)
 - 外耳道湿疹 (External auditory canal eczema)
- 痛い** (Painful)
 - 外耳炎 (External otitis)
 - 急性中耳炎 (Acute otitis media)
- 耳鳴りがする** (Tinnitus)
 - 音響外傷 (Acoustic trauma)
 - 騒音性難聴 (Noise-induced hearing loss)
- 聞こえが悪い** (Poor hearing)
 - 耳管狭窄症 (Eustachian tube dysfunction)
 - 突発性難聴 (Sudden hearing loss)
 - 音響外傷 (Acoustic trauma)
- 耳だれがでる** (Ear discharge)
 - 外耳炎 (External otitis)
 - 急性中耳炎 (Acute otitis media)
- つまる** (Blocked)
 - 耳垢栓塞 (Cerumen impaction)
 - 耳管狭窄症 (Eustachian tube dysfunction)
 - 滲出性中耳炎 (Otitis media with effusion)

外耳炎	耳そうじのしすぎや髪を洗った後に、細菌に感染してなる。 口を動かしたり耳たぶをひっぱると痛い。
急性中耳炎	カゼをひいていて、鼻やのどの細菌が中耳に感染して炎症がおこっている。
慢性中耳炎	急性中耳炎が繰り返されたり、不十分な治療でおこる。
外耳道湿疹	耳そうじのしすぎや耳だれの刺激でなる。
耳垢栓塞	耳あかが耳道をふさいでいる。
耳管狭窄症	中耳と鼻をむすぶ耳管が炎症をおこし、腫れて通気性が悪くなっている。 飛行機に乗った時に耳が詰まる感じに似ている。
滲出性中耳炎	耳管の動きが悪く、鼓膜がひっこみ、中耳に水がたまっている。 カゼやアレルギー性鼻炎の後でおこることが多い。通常、熱や痛みはない。
音響外傷	大音量の音を聞いた後に、内耳の細胞が傷つけられている。
突発性難聴	ある日突然聞こえが悪くなる。原因は不明。
騒音性難聴	長い時間、大きな音を聞き続けることで、内耳の細胞が徐々に傷ついている。